

Estudio comparativo entre el método calorimétrico y el de estimación matemática respecto a la determinación de la energía bruta de subproductos agrícolas

Angélica Chugñay Cargua¹; Zoila Tapia-González²; Marcelo Ramos-Flores³

¹Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, angelica.chugnay@esPOCH.edu.ec

²Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ztapia@esPOCH.edu.ec

³Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, grupo Ciencia de Datos, jmramos@esPOCH.edu.ec

Resumen: Se compararon dos métodos utilizados para determinar el valor de energía bruta de alimentos: calorimétrico, y de estimación matemática, para determinar si existe similitud estadística entre sus resultados, y así considerarlos equiparables. Para ello se prepararon muestras duplicadas de ocho subproductos agrícolas destinados a alimentación animal, una de las cuales se sometió a análisis proximal para posterior aplicación del método de estimación matemática, y la otra se analizó directamente en una bomba calorimétrica. Ambos conjuntos de resultados se caracterizaron mediante estadísticos descriptivos, mostrando ambas distribuciones normal con varianzas no-homogéneas; por lo que se compararon mediante test t con la variación de Welch. El test determinó que las medias de los resultados de ambos métodos presentan diferencia significativa, observándose además la existencia de sesgo positivo, donde el método calorimétrico entrega resultados numéricamente mayores a los del método de la estimación matemática.

Palabras Claves: energía bruta, comparación de métodos, análisis proximal, bomba calorimétrica, sesgo estadístico.

Comparative study between the calorimetric method and that of mathematical estimation regarding the determination of the raw energy of agricultural by-products

Abstract: Two methods used to determine the gross energy value of food: calorimetric and mathematical estimation were compared, in order to determine if there is statistical similarity between their results, and thus consider them both equivalent. To this end, duplicate samples of eight agricultural by-products destined for animal feed were prepared, one of which was subject to proximal analysis for later application of the mathematical estimation method, and the other was analyzed directly in bomb-calorimetric. Both sets of results were characterized by descriptive statistics, showing both normal distribution with non-homogeneous variances; so they were compared using the t test with the Welch variation. The test determined that the means of the results of both methods show a significant difference; in addition, the existence of positive bias was observed, where the calorimetric method delivers numerically higher results than those of the mathematical estimation method.

Keywords: gross energy, comparison of methods, proximal analysis, calorimetric bomb, statistical bias.

1. INTRODUCCIÓN

El Ecuador en sus tres regiones es un país altamente agrícola que posee recursos vegetales disponibles para su utilización en la alimentación de animales; residuos que no son utilizados por desconocimiento del valor nutricional y energético.

1. Profesor de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, angelica.chugnay@esPOCH.edu.ec
2. Profesor de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ztapia@esPOCH.edu.ec
3. Profesor de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, grupo Ciencia de Datos, jmramos@esPOCH.edu.ec

La información sobre el valor energético de alimentos es esencial para ejecutar estudios nutricionales sobre dietas destinadas a tratar la malnutrición calórica o la obesidad en animales (Hernández & Sastre, 1999). Los alimentos pueden valorarse inicialmente por sus propiedades organolépticas, para evaluar si están en condiciones de ser utilizados, así también, por su composición química, para conocer si responden con las especificaciones establecidas y su aporte de energía. Las principales fuentes de energía en los alimentos son las proteínas y el extracto etéreo, la energía bruta es la máxima energía potencial presente en un alimento (Hernández & Sastre, 1999).

La “energía bruta”, EB, es la energía química total almacenada en la materia orgánica que constituye los alimentos. Se expresa como calor de combustión por unidad de peso del alimento (Caravaca Rodríguez, Castel Genís, & Otros, 2005). De acuerdo a la primera ley de termodinámica indica que todas las diferentes formas energía pueden transformarse en calor, de allí que, cuando una sustancia se combustiona, el calor que se desprende es equivalente a la energía bruta almacenado en dicho alimento (Cañas Cruchaga, Aguilar González, García Gómez, Quiroz, & otros, 1992).

La valoración del contenido de energía bruta presente en los alimentos puede ser determinada de forma directa utilizando una bomba calorimétrica, por el método de estimación matemática, partiendo de resultados de un análisis químico proximal previo (Mora Brautigan, 2007). Entre estas dos opciones, el método calorimétrico toma menos tiempo, es más económico y no demanda de análisis previos.

No obstante, antes de considerar que el método calorimétrico pueda reemplazar a la estimación matemática, usada tradicionalmente y que da resultados ampliamente aceptados; se hace necesario comparar estadísticamente sus resultados.

Se carece de investigaciones que analicen a nivel estadístico si los dos métodos presentan similaridad o diferencia entre ellos, además, a la

fecha de realización del estudio, en Ecuador no se disponen de estudios en donde se haya determinado la cantidad de energía bruta de subproductos no convencionales con interés para la alimentación animal.

Estudios similares realizados para comparar el método de estimación matemática y el calorimétrico para la determinación del contenido energético de alimentos, como el de (Batres Gracias, 2004) determinó que los valores de energía bruta obtenidos por estimación matemática, partiendo del análisis químico proximal fueron menores a los valores cuantificados por el calorimétrico, en el caso de productos para alimentación de cerdos. Por otra parte, (Posada, Rosero, Rodríguez, & Costa, 2012), en el caso de alimentos para rumiantes, determinaron por medio de la prueba de Tukey que los dos métodos diferían entre sí, con valores calorimétricos mayores que los procedentes de la estimación matemática.

La investigación realizada consistió en análisis de similaridad estadística entre las medias de valores de energía bruta de ocho subproductos agrícolas no-convencionales, de los cuales se tomaron muestras por duplicado, una de las cuales se analizaron por calorimetría y la otra por estimación matemática. Los resultados permitieron responder a la interrogante si, ambos métodos puedan considerarse equiparables desde un punto de vista de los resultados obtenidos al medir energía bruta.

2. METODOLOGÍA

Población y muestra

La población de estudio estuvo constituida por ocho subproductos agrícolas no-convencionales de la sierra ecuatoriana: trabajando un total de 44 muestras, compuestas por: tronco de brócoli: 12, zanahoria: 13, chaqui sara: 2, hoja de chocho: 6, hoja de maíz: 3, hoja de plátano: 4, polvillo de quinua: 2, hoja de camote: 2. Las muestras fueron recolectadas y seleccionadas según su biodisponibilidad, y sometidas a tratamiento previo de secado y molienda,

separando una porción para aplicación del método calorimétrico y otra para estimación matemática.

Sitio de estudio

La investigación se realizó en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en la ciudad de Riobamba, Ecuador. El tratamiento de muestras y las mediciones se efectuaron en el laboratorio de Bromatología de la Facultad de Ciencias Pecuarias y el procesamiento y análisis de los datos en la Escuela de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias.

Análisis químico proximal

El análisis químico proximal de cada muestra en base seca comprendió de análisis de extracto etéreo, fibra bruta, proteína bruta, extracto libre de nitrógeno. De cada muestra se realizaron análisis por triplicado.

Energía bruta por estimación matemática

Para determinar el valor de energía bruta por el método de estimación matemática se partió de los resultados del análisis químico proximal. Para ello se operaron los valores de extracto etéreo (EE), fibra bruta (FB), proteína bruta (PB) y extracto libre de nitrógeno (ELN, carbohidratos) del alimento a través de la siguiente ecuación (Batres Gracias, 2004):

$$EB=[9(EE)+4(FB)+4(PB)+4(ELN)] \times 10$$

Donde:

EE = Extracto etéreo (%)

FB = Fibra bruta (%)

PB = Proteína bruta (%)

EB = Energía bruta (cal/g)

ELN = Extracto libre de nitrógeno (%)

Estimación por método calorimétrico

Para el método calorimétrico se usó la bomba calorimétrica IKA C 2000, que consiste en una cámara cerrada inyectada con oxígeno, en cuyo interior se combustiona la muestra de alimento mediante ignición con un conductor eléctrico. La cámara está sumergida en agua a temperatura ambiente y, al combustionar la

muestra, provoca un aumento de temperatura del agua circundante. El valor de energía bruta es determinado directamente por el equipo.

Análisis Estadístico

Los resultados de energía bruta de cada subproducto aplicando cada método, fueron analizados, para determinar sus estadígrafos descriptivos (medias, desviaciones estándar, varianzas), adicionalmente se aplicó el Test Anderson-Darling para determinar si los valores obtenidos responden a una distribución Normal.

Se definió como hipótesis nula que las medias de los resultados obtenidos por ambos métodos son similares, con un nivel de confianza del 95%.

$$H_0: \mu_{cal} = \mu_{mat}$$

$$H_a: \mu_{cal} \neq \mu_{mat}$$

Las características de cada conjunto de resultados: datos continuos o discretos, tamaño de muestras, tipo de distribución de resultados, homogeneidad de varianzas, y tipo de análisis (comparación de medias) se utilizaron para definir el tipo de test estadístico a aplicar.

3. RESULTADOS

Los resultados de análisis químico proximal se indican en la Tabla 1:

Tabla 1. Resultados de determinación de energía bruta, por estimación matemática y por calorimetría.

Etiquetas de fila	% Extracto etéreo	% Fibra bruta	% Proteína bruta	% Extracto libre de nitrógeno
Tronco brócoli	3,078	32,218	14,001	32,997
Hoja zanahoria	2,781	21,420	18,857	39,125
Chaqui sara	5,353	18,345	11,450	63,105
Hoja de chocho	3,423	18,455	26,225	38,768
Hoja de maíz	2,357	32,223	16,843	36,723
Polvillo quinua	3,860	19,678	13,943	52,038
Hoja de camote	1,938	20,845	16,920	43,865
Hoja de plátano	5,520	34,020	16,163	33,299

En la Tabla 2, se indican los valores de energía determinados por ambos métodos, sus desviaciones estándar y sus varianzas.

Tabla 2. Resultados de energía, por estimación matemática (izq) y por calorimetría (der)

Sub Producto	Met. Calorimétrico	Met. Estim. Matemática
Tronco de brócoli	3522,7	3445,6
Hoja de zanahoria	3629,1	3426,2
Chaqui sara	4288,5	4197,6
Hoja de chocho	4064,9	3646,2
Hoja de maíz	3868,2	3643,6
Polvillo de quinua	3779,2	3773,8
Hoja de camote	3825,0	3439,5
Hoja de plátano	4016,4	3836,3

Los valores obtenidos presentaron las siguientes características para cada subproducto, y en ambos métodos:

- Datos continuos
- Muestra de tamaño moderado
- Distribución de frecuencias de tipo normal
- Varianzas heterogéneas

Este conjunto de características, llevó a elegir al Test t a dos colas, con variación de Welch, como método inferencial.

Los resultados de energía bruta se ingresaron y analizaron utilizando la aplicación informática Minitab 17 demo, aplicando el Test de Welch a dos colas y con un nivel de significancia del 5% ($\alpha=0,05$), de modo que la probabilidad P debería superar al valor α para considerar que se cumple la hipótesis nula. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 2. Resultados test t de Welch, para hipótesis de similitud de medias entre método calorimétrico y de estimación matemática

SUBPRODU CTO	P	α	RELA CIÓN	RESULT ADO	OBSERVA CIÓN
Tronco de brócoli	0,025	0,025	$P < \alpha$	Ho ₁ se rechaza	$\mu_{cal} \neq \mu_{mat}$
Hoja de zanahoria	0,000	0,025	$P < \alpha$	Ho ₁ se rechaza	$\mu_{cal} \neq \mu_{mat}$
Chaqui Sara	0,615	0,025	$P > \alpha$	Ho ₁ se acepta	μ_{mat} similar μ_{cal}
Hoja de chocho	0,000	0,025	$P < \alpha$	Ho ₁ se rechaza	$\mu_{cal} \neq \mu_{mat}$
Hoja de maíz	0,000	0,025	$P < \alpha$	Ho ₁ se rechaza	$\mu_{cal} \neq \mu_{mat}$
Hoja de camote	0,000	0,025	$P < \alpha$	Ho ₁ se rechaza	$\mu_{cal} \neq \mu_{mat}$
Polvillo de quinua	0,858	0,025	$P > \alpha$	Ho ₁ se acepta	μ_{mat} similar μ_{cal}
Hoja de plátano	0,015	0,025	$P < \alpha$	Ho ₁ se rechaza	$\mu_{cal} \neq \mu_{mat}$

Durante las mediciones se observó que los valores de energía bruta obtenidos por estimación matemática son menores respecto a los obtenidos por método calorimétrico. Para verificar esta observación se hizo un análisis a la totalidad de datos, comprobándose que la media de energía bruta por estimación matemática fue significativamente menor que la media de energía bruta por el método calorimétrico.




Gráfico 1. Prueba de la media de la totalidad de mediciones.

Discusión

En el presente estudio los valores de energía bruta obtenidos oscilan entre los 3175 y 4226 cal/g por el método de estimación matemática, y por el calorimétrico valores entre 3324 y 4340 cal/ g. Teniendo en consideración lo

indicado por (Fillat, García-González, Gómez, & Reiné, 2008), quienes establecen que, en promedio los vegetales poseen un valor de 4400 cal /g de energía bruta, y que el contenido energético de las plantas varía con el tiempo, aumentando en los tejidos maduros, puede afirmarse que los valores encontrados están dentro de lo estimado en la bibliografía.

Respecto a la comparación de los valores de las medias, únicamente en los casos de los subproductos chaqui sara y polvillo de quinua se verificó igualdad estadística; mientras que en los otros seis sub productos el test muestra que los valores medidos por calorimetría no son estadísticamente iguales a los de la estimación matemática. En todos los casos, además se pudo observar y confirmó la presencia de un sesgo positivo, donde los valores por calorímetro son entre 4% y 10% mayores que los de estimación matemática.

Si bien no corresponde a este estudio el determinar la naturaleza y causas de este sesgo, algunas posibilidades incluyen: efecto del contenido de carbohidratos, puesto que alimentos de tipo harina son en los que se verificaron medias estadísticamente iguales; contenido de extracto etéreo puesto que los componentes grasos se caracterizan por generar altas cantidades de energía al ser combustión. Otra posibilidad es que la estimación calorimétrica, al medir calor generado por combustión, tome en cuenta energía producida por componentes no considerados en el cálculo que se aplica en la estimación matemática, tal sea el caso de la fibra.

4. CONCLUSIÓN

Los valores de energía bruta de subproductos agrícolas de la sierra ecuatoriana, obtenidos por estimación matemática presentan un sesgo respecto a los valores obtenidos por el método calorimétrico; siendo los últimos entre 4% y 10% mayores; con excepción de chaqui sara y polvillo de quinua, en los que puede considerarse que los resultados obtenidos por ambos métodos son estadísticamente similares.

No obstante la diferencia de medias, la existencia de un sesgo indica la necesidad de estudios posteriores para correlacionar el efecto de diferentes componentes de los subproductos en los valores de energía bruta.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Laboratorio de Bromatología y Nutrición Animal, de la Facultad de Ciencias Pecuarias, por el acceso a sus instalaciones y uso de equipos; y al grupo de investigación Ciencia de Datos, CITED, por el apoyo en los análisis estadísticos.

REFERENCIAS

- Batres Gracias, R. A. (2004). *Comparación entre el método de estimación matemática y el método de calorimetría para determinar el contenido energético del subproducto de galleta y de panadería para la alimentación de cerdos en desarrollo*. Guatemala: Universidad San Carlos de Guatemala.
- Cañas Cruchaga, R., Aguilar González, C., García Gómez, F., Quiroz, R. A., & otros. (1992). *Simulación de sistemas pecuarios*. San José: RISPAL.
- Caravaca Rodríguez, F. P., Castel Genís, J. M., & Otros. (2005). *Bases de la producción animal*. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- Fillat, F., García-González, R., Gómez, D., & Reiné, R. (2008). *Pastos del Pirineo*. Madrid.
- Hernández, M., & Sastre, A. (1999). *Tratado de nutrición*. Madrid: Días de Santos S.A.
- Mora Brautigán, I. (2007). *Nutrición animal (1ra ed.)*. San José, Costa Rica: EUNED.
- Posada, S., Rosero, R., Rodríguez, N., & Costa, A. (2012). *Comparación de métodos para la determinación del valor energético de alimentos para rumiantes*. Revista MVZ Córdoba, 17(3), 3184-3192.